

ГЕПАТИТ С ИНФЕКЦИЯ

- это воспалительное поражение печени, вызываемое вирусом гепатита С. Инкубационный период инфекции составляет от 14 до 180 дней, чаще 6-8 недель. Вирус может вызывать как острый, так и хронический гепатит, протекающий в легкой форме и/или приводящий к тяжелому заболеванию, включая цирроз и рак печени.

Как распространяется вирус?



Вирус гепатита С распространяется при контакте с кровью и другими биологическими жидкостями инфицированного человека. Это может произойти через:

- Потребление инъекционных наркотиков.
- От матери ребенку.
- Медицинские манипуляции в случае нарушения режима стерилизации медицинского инструментария.
- Половые контакты.
- Контактно-бытовое инфицирование, в том числе при совместном использовании общих предметов личной гигиены, нарушающих целостность кожи и слизистых оболочек.
- Нанесение татуировок или пирсинг при нарушении режима дезинфекции и стерилизации инструментов.



Гепатит С можно предотвратить!

Хотя вакцины для профилактики гепатита С нет, существуют способы, позволяющие снизить риск заражения:

- Не пользоваться личными предметами, которые могли контактировать с кровью и другими биологическими жидкостями человека - глюкометры, бритвы, маникюрные ножницы, зубные щетки и т.п.
- Использовать презерватив при половом контакте.
- Избегать совместного или повторного использования игл, шприцев.
- Не делать татуировки или пирсинг вне специализированных учреждений.



Сдать анализ - единственный способ узнать, есть ли у вас гепатит С.

Анализ крови на наличие антител к вирусу гепатита С (**анти-ВГС**) позволяет определить были ли вы инфицированы вирусом гепатита С - недавно или в прошлом. Если у вас положительный результат на наличие антител, необходимо дальнейшее исследование крови на наличие вируса гепатита С (**РНК ВГС**).



Гепатит С можно вылечить!

Пройти тестирование важно для того, чтобы узнать свой статус и получить жизненно важное лечение. Существуют методы лечения которые могут вылечить большинство людей с гепатитом С за 8-12 недель.

